


PROFILAKTIKA

Veiksmingiausia profilaktikos priemonė – skiepai. Lietuvoje nuo tymų pradėta skiepyti 1964 m. Pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių skiepijami 15,5 - 16 mėn. ir 6 - 7 metų vaikai. Įskiepijus dvi tymų vakcinų dozes, pasiekama patikima ilgalaikė apsauga. Skiepijama kombinuota tymų-epideminio parotito-raudonukės (MMR) vakcina. Skiepai nuo tymų išvengti ligos padeda ir tuomet, jeigu po kontakto su sergančiuoju praėjo ne daugiau nei trys paros.



SAUGOK SAVE IR SAVO ARTIMUOSIUS!




*Ką reikėtų žinoti
apie TYMUS?*




*Parengė visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Raminta Pranckūnė pagal ULAC
informaciją. Mob. 867684778,
raminta.pranckune@sveikatos-biuras.lt*






TYMAI

Tai ūmi, ypač užkrečiama virusinė infekcija, pavojinga ir vaikams, ir suaugusiesiems. Suserga iki 95% nesirgusių ar neskiepytų, kontaktavusių su sergančiais tymais, asmenų.




PLITIMAS


Plinta kosint, čiaudint, per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas ar daiktus. Virusas jautrus ultravioletiniams saulės spinduliams, cheminėms medžiagoms, todėl ant įvairių paviršių išlieka gyvybingas iki 2 valandų.



TYMŲ PLITIMAS, LYGINANT SU KITOMIS LIGOMIS



INKUBACINIS LAIKOTARPIS



Trunka 10 -12 dienų, rečiau – 19-21 dieną. Infekuotas asmuo 4 dienas iki pirmųjų ligos požymių ir pirmas 4-7 ligos dienas tymų virusą išskiria į aplinką.



SIMPTOMAI IR KOMPLIKACIJOS

Karščiavimas, kosulys, sloga, akių junginių uždegimas. Po 1-2 dienų atsiranda bėrimas. Pirmiausia – galvos srityje, vėliau – ant liemens, galūnių. Bėrimui nykstant, jo vietoje kurį laiką išlieka rusva pigmentacija. Komplikacijos: plaučių, gerklų, ausų uždegimai. Galimas smegenų uždegimas.

